abcès dans l'articulation de la jambe

par M. allonel fils. n.° 37. 8.bre 1767

Si La nature est troublée dans quelsques unes de ses opérations ; si, par des dispositions particulières quelsques organes se refusent à l'office auquel ils sont destinés, si La masse des humeurs est infectée par quelsques vices, la cause la plus Légere peut devenir déterminante des accidens Les plus facheux.

1. Une fille parvenüe à L'âge de 25 ans sans avoir eu d'Ecoulement périodique reçut, à l'âge de 16 sur La partie antérieure et inférieure de la cuisse un coup de canne qui ocasiona une tuméfaction assés considérable, arrivée à un certain dégrés elle fut accompagnée d'une douleur qui, pendant deux années, fit claudiquer La malade. Ce tems écoulé, il se forma un dépost à la partie interne de la cuisse dans la region où le coup avoit été porté, la difficulté de marcher augmenta, le dépost fut ouvert et cicatrisé.

2. elle fut à L'hotel-dieu, on soupçonna ankylose. les émolliens, les bains, les mouvemens de la partie furent inutilement emploïés. elle sortit quelque tems après avec le gonflement, la douleur et la difficulté de se soutenir sur cette jambe.

3. Il y a deux ans que cette fille fit une chute sur le genoux ; la douleur, le gonflement augmenterent pendant trois mois : alors la jambe commença à perdre la ligne de direction, elle ceda peu-à-peu aux muscles flechisseurs internes et se courba de plus en plus, le condyle interne du fémur passa sur le condyle externe du tibia. les accidens s'accrurent, le gonflement s'étendit depuis la partie supérieure de la cuisse jusques au dessous de la tubérosité tibiale.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 41 n° 125

4. La Malade étoit dans cet état lors que je fus appellé comme Consultant. des émolliens mêlés avec les résolutifs, une douce chaleur entretenuë, diminuerent à vuë d'œil le gonflement; les douleurs cederent, la malade eut un peu plus de Calme. 15 jours après la douleur reparut et devint plus aiguë, la partie s'enflama, le gonflement qui jusques alors avoit été pâteux et noüeux, devint plus égal, la douleur se calma, une transpiration sensible nous annonça la formation de la matiere, les maturatifs en favoriserent la digestion; nous sentîmes fluctuation et l'ouverture fut faite dans le même endroit du premier depot. Il se fit une grande évacuation de pus et de sang Les injections rendirent le pus plus loüable et la Cuisse s'affaissa.

5. Il se fit un second dépost à la partie externe de la Cuisse; Il fut ouvert, la matiere étoit sanguinolente. la Communication avec le foier précedent s'établit peu de jours après.

Désespérant du sort de cette fille affoiblie si considerablement par les devoiemens et une fievre lente mon zele se refroidit, je la laisai entre les mains du Chirurgien avec qui j'avois de tems à autre des conférences sur la maladie.

6. Quelque tems après il s'ouvrit un depost vers le bord interne de la rotule, la matiere étoit de mauvaise qualité et presqu' entierement sanguinolente.

Il s'éleva entre les deux condyles du femur une tumeur considérable et noüeuse; la fluctuation parut, on eut recours aux Caustiques. Il yeut une très-grande fonte et la suppuration fut abondante.

7. Il sortit par le dépost qui s'ouvrit vers le condyle interne du femur quelques petites Esquilles; Celuici fut le seul du quel découla une matiere noiratre et fœtide.

7. Tous ces depots particuliers communiquerent ensemble
et n'en formerent plus qu'un qui s'étendoit depuis
l'attache inférieure dela moïenne tête du triceps jusques
vers la réunion des gemeaux et du solaire. le devoïment
s'augmenta, la fievre s'éteignit, le marasme succeda
à la Leucophlegmatie et la Malade extenuée succomba.

Examen dela Partie.

Des muscles de cette partie les uns étoient convertis en
une bouillie épaisse et blanchatre; d'autres, ~~été~~ dilacerés
et rongés, représentoient un masse blanche. le foïer
commun étoit rempli d'une matiere de mauvaise odeur.
la capsule articulaire, les ligamens lateraux, les croisés
ne pouvoient plus être reconnus, et de toutes les parties
environnantes l'article il n'y avoit que le ligament
inférieur dela rotule et une portion du croisé droit qui
furent épargnés. quant aux os les condyles internes du
femur et du tibia, une portion dela face inférieure de
la rotule étoient cariés, son cartilage étoit attecté et
la couleur en étoit changée. en outre il est une exostose
longue de deux pouces placée près la bifurcation interne
dela ligne âpre du femur.

Reflexions.

après la mort de cette fille j'appris que son frere à la
suitte d'une chute devint contrefait, que sa sœur étoit
morte de glandes engorgées et ulcerées. d'autres raisons
inutiles à raporter m'ont assuré, mais trop tard, qu'il
y avoit dans ~~cette~~ fille un vice particulier. on voit que
le coup qu'elle reçut sur la cuisse détermina les accidens
énoncés. j'ai remarqué que cette fille 1.° a dater du coup
fut toujours languissante 2.° qu'elle sembla jouir d'un
calme trompeur dès que la nature se fut ouvert un
egoust. le vice prédominant s'affoiblissoit sans doute

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

par les grandes suppurations; mais étant inconnu on ne put s'opposer à ses progrès et la malade en fut la victime. 3° que vers le tems des évacuations périodiques la matiere qui découloit de ses ulceres changeoit ~~[illegible]~~ subitement et devenoit ~~[illegible]~~ très-sanguinolente. 4° qu'après une évacuation de deux jours le pus reprenoit insensiblement sa même forme.

Allouël 2e